observation

Sur vne Tumeur Carcinomateuse a la Jambe

Vers la fin du mois d'octobre de 1733, Je fis a l'hôtel=Dieu l'Amputation de la Jambe a vn jeune homme de 19 ans, qui avoit vne ~~la l'ocasion d'vne~~ tumeur enorme, qu'il portoit a cette partie.

Quinze mois auparavant, il avoit reçu vn coup de pied d'Asne, environ trois travers de doigt au dessus de la maleole externe; Ce coup fut suivy d'vne douleur assés aiguë, et il produisit vne eminence qui au bout de trois semaines etoit grosse comme vn oeuf de poule, vn Chirurgien y fit vne ouverture par laquelle il ne sortis que du sang encore fluide; La difficulté que ce

ARC 42 n° 104

chirurgien eut a en arrester l'effusion luy fit employer divers moyens pour y reussir, tels que la compression et les caustiques, cequi produisit l'effet qu'il en attendoit, jusque la, il avoit craint que la tumeur ne fut aneurismale. Quoy qu'il fut sorty du sang en abondance, la tumeur n'en diminua pas de volume, au contraire la playe ayant eté fermée, cette tumeur fit de nouveaux progrés, en sorte qu'a l'arrivée du malade a l'hôtel Dieu, elle avoit acquis le volume et la figure d'un trés gros melon: elle etoit située a la partie moyenne inferieure externe de la jambe droitte, sa surface se trouvoit sillonnée par plusieurs tendons qui passoient dessus, ainsy elle etoit bornée d'un côté par le tibia, et de l'autre par les muscles extenseurs du pied, (qu'elle avoit neanmoins dejettés un peu en dehors) ce

qui la rendoit trés jmobile, dure, jnegale,
et exactement circonscripte, et quoy malgré
que le tendon d'achile parût avoir perdu
son ton naturel, le malade ne laissoit
pas de marcher.

Aprés l'Amputation, je presentay la Jambe
à cette Academie, et je dissequay la
tumeur en sa presence : Nous observâmes
1°. Qu'elle n'étoit recouverte par la partie
anterieure que de la peau et de la
membrane graisseuse, et par la partie
posterieure de la partie jnferieure des
fibres charnuës des muscles qui forment
le tendon d'achile. 2°. Que l'aponevrose
du muscle fascialata qui etoit fort
epaisse, en formoit le Kiste. 3°. Que
les muscles Jambiers tant anterieurs que
posterieurs, les Peroniers, et les autres

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Muscles qui entourent le Peroné etoient compris dans la tumeur; leurs fibres charnuës avoient si peu de consistance quèlles ne formoient plus qu'une matière semblable a de la lie de vin epaissie, mais ce qui me parût de plus singulier, c'est que le Peroné la traversoit dans toute la longueur, et que la partie de cet os enfermée dans la tumeur etoit devenuë carnifiée; ses fibres osseuses avoient tellement perdu leur consistance, quèlles s'en alloient en bouillie, de couleur semblable a celle des chairs: l'endroit du ligament interosseux qui y repondoit, achevoit en s'unissant avec l'aponevrose du fascialata de former le Kiste, et la face externe du tibia, etoit un peu deprimée.

Reflexion

Le Coup de pied que le malade a reçu
a vraysemblablement ocasioné une fracteure
au Peroné, qui ne la point dabord
empesché de marcher, parceque les
pieces fracturées de cet os, ne soufrents
pas grand derangement, lorsque le tibia
reste dans son entier, mais le suc nouricier
de los, nayant point eté retenu par les
bandages, et par la situatiation
necessaire, jl a eu toute la liberté de
séchaper par lextremité des pieces
fracturées, cest sans doute cequi a
produit lapetite tumeur qui a parû
peu de temps aprés le coup: Je concoit
donc que le suc nouricier de los en
sépanchant ala circonference des bouts
fracturés, a formé une espece de chair

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

fongueuse, qui par l'abord des nouveaux
sucs a augmenté a un point intolerable.
On doit d'autant plus le croire ainsi
que la difficulté que le chirurgien a
eu a arrester le sang qui sortoit par
l'incision qu'il fit a la tumeur, etoit
bien moins causée par le volume des
vaisseaux de cette partie, que par la
decomposition des principes du sang.

Boudon